

Preguntas frecuentes: Departamento de Emergencias Julia & George Argyros en CHOC Children's Hospital

¿Dónde estaciono?

El servicio de valet está disponible las 24 horas del día por \$2 con validación del departamento de emergencias. El puesto del servicio de valet está cerca del acceso al departamento de emergencias, y se puede entrar desde Pepper Street.

¿Qué debo traer al departamento de emergencias (ED, por sus siglas en inglés)?

- Pañales, leche de fórmula y otros suministros para bebés
- Una lista de todos los medicamentos que toma su hijo
- Cualquier documentación sobre derivaciones, radiografías o resultados de laboratorio
- Una manta, un muñeco de peluche, un juguete favorito u otro artículo que le ofrezca consuelo
- Artículos de necesidad personal, como cargador de teléfono celular y cambio para el teléfono público

¿Qué no debo traer al departamento de emergencias?

No se permiten comidas ni bebidas en el ED. Su consumo antes del tratamiento puede poner al niño en riesgo. Si es posible, intente hacer los arreglos necesarios para el cuidado de los hermanos lactantes durante el período de gripe estacional. Los bebés corren más riesgo de contraer la gripe.

¿Por qué a algunos pacientes que llegaron después de mi hijo se los atiende primero?

A los pacientes se los atiende según la gravedad del cuadro o de la lesión, no por orden de llegada. Recuerde que los pacientes que llegan en ambulancia se admiten en un área que usted no ve. Si ha estado esperando y está preocupado porque cree que su hijo empeora, pida a un enfermero que lo vuelva a evaluar.

¿Quiénes son todos los miembros del personal del departamento de emergencias?

Los enfermeros, vestidos con uniformes color granate, ayudan a examinar y evaluar a los pacientes; algunos ayudan en los análisis de laboratorio o las radiografías. Los técnicos médicos de emergencias (EMT, por sus siglas en inglés) usan uniformes color tostado y son los encargados de controlar los signos vitales y medir la altura y el peso. Los EMT avisarán a los enfermeros del vestíbulo si se producen cambios en el paciente.